

Übungsserie 4

Aufgabe 1: Pauli-Matrizen und Elektronenspin (1+1+1+1 Punkte)

Betrachten Sie die Pauli-Matrizen $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$, die durch

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_x &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \hat{\sigma}_y &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\ \hat{\sigma}_z &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

gegeben sind.

- Sind Pauli-Matrizen hermitesch? Was bedeutet das physikalisch?
- Die Pauli-Matrizen stellen die Operatoren für die Spinkomponenten von Spin $\frac{1}{2}$ -Teilchen dar. Können wir alle drei Komponenten des Elektronenspins mit gleicher Präzision messen?
- Können wir $\hat{\sigma}_x^2, \hat{\sigma}_y^2, \hat{\sigma}_z^2$ mit gleicher Präzision messen?
- Betrachten Sie ein Elektron mit Impuls p und Ort x . Können wir p und x gleichzeitig mit beliebiger Präzision messen?

Aufgabe 2: Teilchen auf einem Ring (3+3+2+2+(4) Punkte)

Betrachten Sie ein Teilchen der Masse m im Potential (alle Einheiten sind in SI)

$$V(\varphi) = \begin{cases} 1, & r = R \\ \infty, & \text{sonst} \end{cases},$$

wobei r und φ Polarkoordinaten sind.

- Stellen Sie die zeitunabhängige Schrödingergleichung auf und finden Sie passende Randbedingungen für die Wellenfunktion.
- Bestimmen Sie die normierten Wellenfunktionen sowie die Energieeigenwerte des Teilchens.
- Zeigen Sie, dass die in b) gefundenen Eigenfunktionen des Hamiltonoperators auch Eigenfunktionen des Operators $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$ sind und finden Sie die entsprechenden Eigenwerte l .
- Interpretieren Sie \hat{L}_z physikalisch, indem Sie einen Zusammenhang mit der klassischen Mechanik herstellen.
- (Bonus)** Betrachten Sie nun das Teilchen im Potential

$$V(\varphi) = \begin{cases} 1, & r = R, 0 \leq \varphi \leq \pi/2 \\ \infty, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Wie ändern sich die Randbedingungen, möglichen Wellenfunktionen und Energieeigenwerte des Teilchens im Vergleich zum vorherigen Teil der Aufgabe? Gibt es Zustände, in denen die Wellenfunktion eine Eigenfunktion von \hat{L}_z ist?

Aufgabe 3: Wahrscheinlichkeitsdichten (3+2 Punkte)

Der Hamiltonoperator für die Bewegung eines geladenen Teilchens (Ladung q) in einem (reellen) elektromagnetischen Feld, das durch das raum- und zeitabhängige Vektorpotential (A_x, A_y, A_z) und durch das skalare Potential Φ beschrieben wird, lautet:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left[\left(\hat{p}_x - q\hat{A}_x \right)^2 + \left(\hat{p}_y - q\hat{A}_y \right)^2 + \left(\hat{p}_z - q\hat{A}_z \right)^2 \right] + q\hat{\Phi}.$$

Hierin sind $\hat{A}_x = A_x(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, t)$ (analog \hat{A}_y, \hat{A}_z) und $\hat{\Phi}_x = \Phi(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, t)$.

- a) Finden Sie einen Ausdruck für die Wahrscheinlichkeitsstromdichte und leiten Sie die entsprechende Kontinuitätsgleichung ab.
- b) Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte für den Ort eines Teilchens und die Wahrscheinlichkeitsstromdichte invariant unter der Eichtransformation

$$\hat{A} \rightarrow \hat{A}' = \hat{A} + \nabla\Lambda \quad \Psi \rightarrow \Psi' = e^{\frac{iq\Lambda}{\hbar}} \Psi$$

ist. Hierbei ist $\Lambda(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, t)$ ein reelles, skalares Potential.